

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА

- Предупреждение контактов с больными активной формой туберкулеза
- Вакцинация против туберкулеза в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.



Противотуберкулезная вакцинация обеспечивает предупреждение тяжелых распространенных форм заболевания у детей, снижает риск летальных исходов.

СИМПТОМЫ, ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ НА ТУБЕРКУЛЕЗ



- **Увеличение** периферических лимфатических узлов
- **Наличие крови** в мокроте
- **Боль** в груди
- **Кашель** на протяжении 2-3 недель и более
- **Периодическое** повышение температуры
- **Одышка**
- **Потеря** веса
- **Потливость** по ночам
- **Общее недомогание** и слабость.

ДИАГНОСТИКА

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБА МАНТУ

Это не прививка, а диагностический тест на присутствие в организме микобактерий туберкулеза.

Она проводится независимо от результатов предыдущей пробы 1 раз в год детям от 12 месяцев до 7 лет в условиях образовательного учреждения или в поликлинике по месту жительства. Детям из группы риска проба манту ставится 2 раза в год в условиях поликлиники.



ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБА ДИАСКИНТЕСТ

Современный диагностический препарат с аллергеном туберкулезным рекомбинантным. Диаскинтест проводится так же, как Манту: делают внутрикожную инъекцию и проверяют результат через 72 часа. Ежегодно проводится детям с 8 до 17 лет.

ФЛЮОРОГРАФИЯ

Способ диагностики туберкулеза легких у лиц старше 15 лет 1 раз в год (кроме отдельных групп населения).



ТУБЕРКУЛЕЗ – ХРОНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ



Развивается очень медленно. В течение заболевания различают 2 феномена — **ИНФИЦИРОВАНИЕ** И **ЗАБОЛЕВАНИЕ**.

ИНФИЦИРОВАНИЕ — это проникновение микобактерий в организм человека или животного при отсутствии каких-либо симптомов.

ЗАБОЛЕВАНИЕ — появление клинически выраженных признаков.



От момента заражения до развития болезни может пройти от нескольких недель до нескольких лет.

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ **ПРО ТУБЕРКУЛЕЗ**



МИКОБАКТЕРИИ


ТУБЕРКУЛЕЗА

— крупные палочки, чрезвычайно живучие, выдерживают

нагревание до **90 °C**, низкие

температуры — до **-260 °C**, высушивание, хорошо


сохраняются во влажной среде, но не выдерживают прямого солнечного света.



ЧЕЛОВЕК ЗАРАЖАЕТСЯ через воздух или предметы при контакте с больным с активной формой туберкулеза.



ЗАРАЖЕНИЕ ВОЗМОЖНО при употреблении молока и молочных продуктов, мяса животных, больных туберкулезом.



24 МАРТА —
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
